


# Données administratives vs codification des rapports des intervenants en protection de la jeunesse : laquelle est la plus associée aux difficultés de l'enfant?

Dominic Poiré<sup>1,4</sup>, Alycia O'Leary<sup>1,4</sup>, Chantal Cyr<sup>1,4</sup>, Miguel M. Terradas<sup>2,4</sup>, Sophie Couture<sup>2,4</sup> et Sébastien Monette<sup>1,2,3,4</sup>

1, Université du Québec à Montréal (UQAM);  
2, Université de Sherbrooke (UdS)  
3, Université de Montréal (UdeM)  
4, Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD);



## INTRODUCTION

- La maltraitance est un phénomène mondial qui touche des millions d'enfants, la prévalence à vie est estimée entre 13 et 35 % dépendamment des sous-types de maltraitance (Stoltenberg et al., 2015).
- Deux stratégies sont généralement utilisées pour estimer la maltraitance à partir des dossiers des services de protection de la jeunesse (SPJ) :
  - L'extraction de données administratives, permettant d'obtenir rapidement de vastes quantités de données directement exploitables;
  - L'extraction et la codification des rapports narratifs d'évaluation de signalement des intervenants (~10-15 pages/rapport) à l'aide d'une grille standardisée, comme le *Extended Modified Maltreatment Classification System* (EMMCS).
- Très peu d'études ont comparé ces deux méthodes d'extraction des données de maltraitance des SPJ. Parmi ces rares études, celle de Runyan et al. (2005) a montré que la maltraitance mesurée par la codification des rapports prédit mieux le fonctionnement de l'enfant que les données administratives.
- **L'objectif** de cette étude est d'examiner les liens entre deux scores composites de maltraitance globale (un construit à partir des données administratives et l'autre à partir des rapports codés) et le dysfonctionnement de l'enfant.

## MÉTHODE

### Participants:

- 177 enfants d'âge scolaire (106 garçons,  $M_{\text{âge}} = 8,9$ ;  $E.T. = 2,0$ ) placés en familles d'accueil ( $n = 119$ ) ou en centre de réadaptation ( $n = 58$ ) dans les services de protection de la jeunesse de six régions du Québec.

La maltraitance mesurée par la codification des rapports narratifs des intervenants à l'aide d'une grille (EMMCS) permet une meilleure prédiction du dysfonctionnement de l'enfant, comparée à la maltraitance mesurée par les données administratives.

**Tableau 1**

**Corrélation entre les deux scores composites de maltraitance (données administratives vs EMMCS) et le fonctionnement de l'enfant**

Variable	Admin.	EMMCS
BRIEF-2 (Score global): fonctions exécutives	.05	.16*
ToMI-2 (score composite renversé): cognition sociale	.00	.18*
TSC-YC (score total): stress post traumatique	-.02	.10
CBRS: TDAH-inattention	.04	.11
CBRS: TDAH-hyperactivité-impulsivité	.07	.18*
CBRS: Trouble de la conduite	.10	.20**
CBRS: Trouble oppositionnel avec provocation	.08	.16*
CBRS: Épisode de dépression majeure	.04	.18*
CBRS: Épisode maniaque	.08	.21**
CBRS: Trouble d'anxiété généralisé	.04	.19*
CBRS: Trouble d'anxiété de séparation	-.03	.07
CBRS: Trouble d'anxiété sociale	.04	.14
CBRS: Trouble obsessionnel compulsif	-.08	.08
CBRS: Trouble du spectre de l'autisme	.13	.16*

Notes. BRIEF-2 = Behavioral Rating Inventory of Executive Function; ToMI-2 = Theory of Mind Inventory-2; TSC-YC = Trauma Symptom Checklist for Young Children; CBRS = Conners Comprehensive Behavior Rating Scales.  
\* $p < .05$ , \*\* $p < .01$ .

## Mesures

- Huit types de maltraitance ont été pris en considération : Abus physique, Abus sexuel, Négligence physique, Négligence psychologique/éducative, Négligence par manque de surveillance, Maltraitance psychologique, Exposition à la violence conjugale, Exposition à d'autres événements potentiellement traumatiques
- Un score composite de maltraitance global a été généré à partir des deux sources suivantes :
- Rapports narratifs d'évaluation de signalement codés avec la grille *Extended Maltreatment Classification System* (EMMCS) : score combiné de sévérité (0-5) et fréquence (0-5) pour les 8 types de maltraitance (score total : 0-80) ;
- **Données administratives**: présence (oui/non) des 8 types de maltraitance à vie (score total : 0-8)
- Les figures de soins ont complété différents questionnaires concernant le fonctionnement de l'enfant : BRIEF-2 (fonctions exécutives), ToMI-2 (cognition sociale), TSC-YC et Conners CBRS (symptômes de plusieurs psychopathologies).

## RÉSULTATS et DISCUSSION

- Le score composite de maltraitance créé à partir du EMMCS corrèle avec 9/14 des indicateurs de dysfonctionnement de l'enfant, alors que le score composite de maltraitance créé à partir des données administratives ne corrèle avec aucun de ces indicateurs.
- Ces résultats suggèrent que la mesure de maltraitance à partir de la codification des rapports des intervenants à l'aide d'une grille comme le EMMCS montre une meilleure validité convergente avec des indicateurs du dysfonctionnement de l'enfant et soulève des questionnements sur la validité de la maltraitance lorsqu'estimée à partir des données administratives.